消滅登革熱 先了解病媒蚊

登革熱主要是藉由病媒蚊叮咬人時
將病毒傳入人體內，並不會人傳人

埃及斑蚊

喜歡棲息於室內的人工容器
或是人為所造成積水的地方

白線斑蚊

比較喜歡棲息於室外

蚊子咬一口 傳染力至死方休

斑蚊叮了登革熱病患，病毒在蚊子體內增殖，
除非這隻斑蚊被打死，不然牠就具有
終生傳染病毒的能力！當牠再叮咬其他人時，
就會把體內的登革病毒傳染給另一個人唷！



沒有孳生源 沒有病媒蚊

不讓蚊子的幼蟲「孑孓」生長，就能避免蚊子傳播登革熱

消滅登革熱，首要任務就是清除孳生源

你周遭的孳生源清理乾淨了嗎?



孑孓最愛的地方



01 水桶、碗盆、瓶罐



02 盆栽底座、花瓶水

03 保麗龍盒、紙盒、餅乾盒

04 水缸、浴缸、水族箱

05 水溝、水窪

06 帆布、塑膠布



07 輪胎

08 洗衣槽、馬桶

別管強哥了!你聽過有種卵生命力超強嗎?

斑蚊卵可以耐旱三個月，再遇水3天內就會孵化
且雌蚊會把卵產在容器內壁接近水面處，
所以除了倒掉積水，還要把容器刷洗乾淨，
才能完全清除蚊卵唷!

巡倒清刷 巡倒清刷 巡倒清刷 很重要所以說三次



感染登革熱症狀有哪些?

如果出現下列症狀，有可能感染了登革熱，務必儘速就醫!

一般症狀

警示徵象

感染登革熱？科學檢驗好快速

是否感染登革熱，現在有兩種方法可以快速檢驗

or



- 醫療院所可用「登革熱NS1快篩試劑」檢驗，約20-30分鐘可知道結果。
- 由醫療院所通報送驗，檢驗結果約一天內即可知道。

感染登革熱 遵守醫囑待痊癒

如果感染了登革熱，就醫後還應該要....

- ☑ 遵照醫師指示**服藥、休息、多喝水**。
- ☑ 發病5日內，應避免再被蚊蟲叮咬
  將病毒藉由蚊蟲散播出去。
- ☑ **做好防蚊措施**



夏日防蚊大作戰 二部曲

先防蚊還是先防曬？

夏日炎炎，如何對抗紫外線又兼顧防蚊?
建議先擦防曬乳，等待防曬乳吸收後再噴防蚊液!

衛生福利部疾病管制署 TAIWAN CDC 廣告

防蚊不分內外

防疫從早到晚

室外

室內

- 擦防蚊藥品
- 穿淺色長袖衣褲
- 容器清空倒置
- 廢棄容器回收處理
- 紗窗
- 蚊帳
- 電蚊拍
- 養大肚魚、孔雀魚
- 捕蚊燈

衛生福利部疾病管制署 廣告